

お店でよく見かける解熱鎮痛薬の分類（令和4年10月25日時点）

厚生労働省HPより改変

○このリストは製品や成分、注意事項の一部の内容をまとめたものであり、全てを網羅したものではありません。購入の際は薬剤師や登録販売者に相談して購入するようにしてください。

○ブランド名が同じでも、アルファベットや「新」などが付いていると違う製品になり、成分や対象年齢などが異なることがあります。製品の内容をよく確認し、薬剤師や登録販売者に相談して購入するようにしてください。

主な有効成分	製品名	対象年齢	有効成分の含量（1錠・包）	含まれる有効成分				飲んではいけない人
				NSAIDs	眠くなる成分	カフェイン	胃粘膜保護成分	
「アセトアミノフェン」のみ	タイレノールA	15歳以上	300mg					
	ラックル	15歳以上	300mg					フェニルケトン尿症の人
	バファリンルナ	7歳以上	100mg					
	小児用バファリンCII	3～14歳	33mg					
	小児用バファリン チュアブル	3～14歳	50mg					
	こどもバブロン坐薬	1～12歳	100mg					
「アセトアミノフェン」+NSAIDs	セデス・ハイ	15歳以上	125mg	○	○	○		
	セデス・ハイG	15歳以上	250mg	○	○	○		
	ノーシン	15歳以上	300mg	○		○		
	ハッキリエースa	11歳以上※	230mg	○		○		
	ナロン錠	8歳以上※	132.5mg	○	○	○		
	新セデス錠	7歳以上※	200mg	○	○	○		
※15歳未満の小児で水ぼうそう又はインフルエンザにかかっている又はその疑いのある場合は、薬剤師等に相談してください								
「イブプロフェン」のみ	リングルアイビー	15歳以上	150mg	○				出産予定日12週以内の妊婦
	リングルアイビーα200	15歳以上	200mg	○				出産予定日12週以内の妊婦 胃・十二指腸潰瘍、肝臓、腎臓、心臓又は血液の病気、高血圧の人、ジドブジンを投与中の人
イブプロフェン+その他の成分	イブA錠	15歳以上	75mg	○	○	○		出産予定日12週以内の妊婦
	イブA錠EX	15歳以上	100mg	○	○	○		
	ノーシンピュア	15歳以上	75mg	○	○	○		
	メリドンEV錠	15歳以上	75mg	○	○	○		
	イブクイック頭痛薬DX	15歳以上	100mg	○	○	○	○	
	イブクイック頭痛薬	15歳以上	75mg	○	○	○	○	
	ディバシオIpa	15歳以上	75mg	○	○	○		
アセトアミノフェン+イブプロフェン	バファリンプレミアム	15歳以上	65mg	○	○	○	○	出産予定日12週以内の妊婦
	バファリンプレミアムDX	15歳以上	80mg	○		○	○	出産予定日12週以内の妊婦 胃・十二指腸潰瘍、肝臓、腎臓、心臓又は血液の病気、高血圧の人、ジドブジンを投与中の人
	バファリンルナi	15歳以上	65mg	○		○	○	出産予定日12週以内の妊婦
イブプロフェン+その他のNSAIDs	ナロンエースT	15歳以上	72mg	○	○	○		出産予定日12週以内の妊婦
アスピリン+その他の成分	バファリンA	15歳以上	330mg	○			○	
	ケロリン	15歳以上	600mg	○		○	健胃(ケイヒ末)	
ロキソプロフェンのみ	ロキソニンS	15歳以上	60mg	○				出産予定日12週以内の妊婦
	ロキソプロフェン錠「クニヒロ」	15歳以上	60mg	○				
ロキソプロフェン+その他の成分	ロキソニンSプラス	15歳以上	60mg	○			○	胃・十二指腸潰瘍、心臓、肝臓、腎臓、血液の病気の人
	ロキソニンSクイック	15歳以上	60mg	○			○	
	ロキソニンSプレミアム	15歳以上	60mg	○	○	○	○	

OTC医薬品の解熱剤（熱さまし）等の適正使用の詳細情報は、PC・スマホ等で「おくなり検索」から調べられます。

PC版：https://jsm-db.info/

スマホ版：https://search.jsm-db.info/sp/index.php

英語版：http://search.jsm-db.info/sp_en/index.php

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html) より一部改変