

お店でよく見かける解熱鎮痛薬の分類（令和4年11月11日時点）

厚生労働省HPより改変

○このリストは製品や成分、注意事項の一部の内容をまとめたものであり、全てを網羅したものではありません。購入の際は薬剤師や登録販売者に相談して購入するようにしてください。

○ブランド名が同じでも、アルファベットや「新」などが付いていると違う製品になり、成分や対象年齢などが異なることがあります。製品の内容をよく確認し、薬剤師や登録販売者に相談して購入するようにしてください。

主な有効成分	製品名	対象年齢	含まれる有効成分				飲んではいけない人
			NSAIDs	眠くなる成分	カフェイン	胃粘膜保護成分	
「アセトアミノフェン」のみ	タイレノールA	15歳以上					
	ラックル	15歳以上					フェニルケトン尿症の人
	バファリンルナ	7歳以上					
	小児用バファリンCII	3～14歳					
	小児用バファリン チュアブル	3～14歳					
	こどもパブロン坐薬	1～12歳					
「アセトアミノフェン」+NSAIDs	セデス・ハイ	15歳以上	○	○	○		
	セデス・ハイG	15歳以上	○	○	○		
	ノーシン	15歳以上	○		○		
	ハッキリエースa	11歳以上※	○		○		
	ナロン錠	8歳以上※	○	○	○		
	新セデス錠	7歳以上※	○	○	○		
※15歳未満の小児で水ぼうそう又はインフルエンザにかかっている又はその疑いのある場合は、薬剤師等に相談してください							
「イブプロフェン」のみ	リングルアイビー	15歳以上	○				出産予定日12週以内の妊婦
	リングルアイビーα200	15歳以上	○				出産予定日12週以内の妊婦 胃・十二指腸潰瘍、肝臓、腎臓、心臓又は血液の病気、高血圧の人、ジドブジンを投与中の人
イブプロフェン+その他の成分	イブA錠	15歳以上	○	○	○		出産予定日12週以内の妊婦
	イブA錠EX	15歳以上	○	○	○		
	ノーシンピュア	15歳以上	○	○	○		
	メリドンEV錠	15歳以上	○	○	○		
	イブクイック頭痛薬DX	15歳以上	○	○	○	○	
	イブクイック頭痛薬	15歳以上	○	○	○	○	
アセトアミノフェン+イブプロフェン	バファリンプレミアム	15歳以上	○	○	○	○	出産予定日12週以内の妊婦
	バファリンプレミアムDX	15歳以上	○		○	○	出産予定日12週以内の妊婦 胃・十二指腸潰瘍、肝臓、腎臓、心臓又は血液の病気、高血圧の人、ジドブジンを投与中の人
	バファリンルナi	15歳以上	○		○	○	出産予定日12週以内の妊婦
イブプロフェン+その他のNSAIDs	ナロンエースI	15歳以上	○	○	○		出産予定日12週以内の妊婦
アスピリン+その他の成分	バファリンA	15歳以上	○			○	出産予定日12週以内の妊婦
	ケロリン	15歳以上	○		○	健胃(ケイヒ末)	
ロキソプロフェンのみ	ロキソニンS	15歳以上	○				出産予定日12週以内の妊婦
	ロキソプロフェン錠「クニヒロ」	15歳以上	○				
ロキソプロフェン+その他の成分	ロキソニンSプラス	15歳以上	○			○	胃・十二指腸潰瘍、心臓、肝臓、腎臓、血液の病気の人
	ロキソニンSクイック	15歳以上	○			○	
	ロキソニンSプレミアム	15歳以上	○	○	○	○	

OTC医薬品の解熱剤（熱さまし）等の適正使用の詳細情報は、PC・スマホ等で「おやすみ検索」から調べられます。

PC版：<https://jsm-db.info/>

スマホ版：<https://search.jsm-db.info/sp/index.php>

英語版：http://search.jsm-db.info/sp_en/index.php

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html) より一部改変